

第⑦⑨回

ドクターマツノ認知症ゼミ

2023年12月10日 オンライン27
市川フォレストクリニック 松野晋太郎

市川フォレストクリニック (2015年5月開設)

視野を拡げ最適な治療法を創造
すべての不調を調和させていく

認知症治療学
コウノメソッド

循環器
内科学

漢方医学

認知症の患者さんと家族の 笑顔を取り戻すために

PART①

認知症の治し方を教えてくださった患者さん

PART②

もの忘れだけが認知症ではありません
タイプと症状は人それぞれ

PART③

薬が原因で認知症の症状が出ている可能性があります

PART④

認知症の治療は西洋薬+漢方薬+サプリメントの3本立て

PART⑤

認知症のタイプ別治療法と症状が改善した実例

2023年12月07日現在 Amazon

新品 & 中古 1527円～15675円 残29冊 Kindle版499円

2021年3月初版
主婦の友社

認知症をあきらめない！薬を減らして症状を改善

認知症 笑顔が よみがえる 治し方

市川フォレストクリニック院長
松野晋太郎

- 認知症のタイプや症状は十人十色
- アルツハイマーだけが認知症ではない
- 実例でよくわかる、認知症の改善体験
- 薬とサプリメントの効果的な使い方
- 脳機能の改善効果が望める新療法

家族も本人も
ぐんと楽になる
治療法

主婦の友社

笑顔=ナチュラルキラー細胞の活性化

＜笑いがもたらす効果＞ +5000

- NK(ナチュラルキラー)細胞の活性化
- 怒り(-3000)・不安・うつ状態の緩和
- ストレス・痛みの軽減
- 血圧降下・血糖値降下
- 心筋梗塞リスク低下・呼吸器機能改善

近畿大学心療内科 阪本 亮 「PRESIDENT」 2019年12月

もの忘れだけが認知症ではありません
タイプと症状は人それぞれ

治療可能な認知機能低下

- ・うつ状態
- ・代謝異常(甲状腺機能低下症)
- ・正常圧水頭症
- ・慢性硬膜下血腫
- ・薬害
- ・中毒性疾患(アルコール)

認知症の病型分類

アルツハイマー型認知症 ATD

前頭側頭型認知症 bvFTD ≈ ピック病

- ・脱抑制型
- ・無欲型
- ・常同型

レビー小体型認知症 DLB

- ・幻視妄想型
- ・パーキンソン型
- ・意識障害型

脳血管性認知症 VD

軽度認知障害 MCI

神経難病 LPC

- ・進行性核上性麻痺 PSP
- ・大脳皮質基底核変性症 CBD
- ・多系統萎縮症 MSA


原発性進行性失語 PPA

- 1) 意味性認知症 SD
- 2) 進行性非流暢性失語 PNFA

超高齢者タウオパチー(85歳以上)

- 1) 嗜銀顆粒性認知症 AGD
- 2) 神経原纖維変化型老年期認知症 SDNFT
(病理診断)

アルツハイマー型認知症は除外診断



アルツハイマー型と意味性認知症は遅延再生が苦手

	HDS-R 長谷川式認知症スケール	アルツ (ATD)	レビー (DLB)	ピック (FTD)	意味性 (SD)
4	3単語復唱 「桜 猫 電車」	問題なく言える	できる (小声)		質問の意味が 理解できない (語義失語)
5	引き算 $100 - 7 =$ $93 - 7 =$	得意	苦手 (長考)		
6	数字逆唱 6 8 2を後ろから 3 5 2 9はどうですか	得意	苦手		
7	遅延再生 先ほど覚えた3つの 言葉は何でしたか	苦手 2/6点以下	得意	考え無精 不機嫌になる ↓ (中止)	苦手 2/6点以下 ↓ FTLD 検出セット

語義失語検出セット (コウノメソッドでみる認知症診療 河野和彦 著)

	医師の指示	語義失語のある患者の反応や答え
1	右手で左肩を叩いてください	左手をさする医師の肩を叩く
2	サルも木から落ちる どんな意味ですか？	サルが木から 滑り落ちることです
3	A) 弘法も筆の 続きを言ってください B) 犬も歩けば 続きを言ってください	聞いたことないなあ え～(絶句)
4	利き手はどちらですか？	利き手って何だろう？

2問不正解で語義失語あり→意味性認知症 (SD)

レビースコア (コウノメソッドでみる認知症診療 河野和彦 著)

	調査項目	ポイント	スコア
問診	薬剤過敏性(風邪薬などが効きすぎてしまう)	2	
	幻視(2点) 妄想(人がいるような気が)(1点)	2	
	意識消失発作(明らかにてんかんは除く)	1	
	夜間の寝言(1点) 叫び(2点)	2	
	嚥下障害(食事中にむせやすい)	1	
	真面目な性格	1	
問診 診察	日中の嗜眠 1時間以上の昼寝	2	
	安静時振戦	1	
診察	歯車現象(2点) ファーストリジッド(1点)	2	
	体が傾斜することがあるか(2点) 軽度(1点)	2	
	合計	16	


3点以上ならば純粋なアルツハイマー型認知症ではない

ピックスコア (コウノメソッドでみる認知症診療 河野和彦 著)

場面		分類	状況
態度	1	機嫌	診察拒否傾向 不機嫌 採血の時叫ぶ
	2	横柄さ	医師の前で腕や足を組む 子供っぽい ガムを噛む
	3	集中力	なかなか座らない 立ち上がる 勝手に出てゆく
診察	4	語義失語	FTLD検出セット(2)
	5	失語・反復	知能検査中に「どういう意味？」と振り返る オウム返し(2)
	6	被影響性	勝手にカルテを触る モニターを覗く 口笛・鼻歌(2)
	7	失語	ADLがよいのにHDS-Rが7点以下だった
問診	8	反社会的	盗食、万引きが1度でもあった
	9	食行動	病的に甘いものが好き 過食 異食 搔き込み 性的亢進
	10	衝動性	スイッチが入ったように怒って けろっとなおる
	11	依存性	家族の後ろをついてくる 一人にされると怒る 人混みで興奮

4点以上であればピックタイプの可能性90%

認知症外来 連続100名の病型分類



2019年10月

DLB:レビー小体型認知症

AGD:嗜銀顆粒性認知症

ATD:アルツハイマー型認知症

FTD:前頭側頭型認知症

SD:意味性認知症

VD:脳血管性認知症

薬が原因で認知症の症状が
出ている可能性があります

抗認知症薬の副作用

興奮性	歩行悪化	傾眠	食欲低下 嘔気	徐脈 心停止
ドネペジル ガランタミン リバスチグミン メマンチン	ドネペジル	メマンチン ガランタミン リバスチグミン	ガランタミン ドネペジル リバスチグミン	ドネペジル リバスチグミン ガランタミン メマンチン
下痢	便秘	頻尿		
ドネペジル	メマンチン	ドネペジル リバスチグミン		

抗認知症薬の使用率は34/100 (2019年10月)

- ドネペジル(アリセプト[®])
3名 (5mg 2名 10mg 1名)
- ガランタミン(レミニール[®])
6名 (4mg × 1 3名 4mg × 2 3名)
- リバスチグミン(リバスタッチ[®]・イクセロン[®])
9名 (2.25mg 1名 4.5mg 7名 9mg 1名)
- メマンチン(メマリー[®])
18名 (2.5mg 1名 5mg 8名 10mg 9名)

* 未使用66名

薬害(医原性)認知症

薬は代謝酵素を阻害→老化促進

1) **スタチン**: ミトコンドリア毒→ATP(エネルギー)不足→心不全
ビタミンK2合成阻害→動脈硬化・認知症・骨粗鬆症

2) **降圧剤**: 脳血流低下→夜間せん妄・認知症

3) **胃酸抑制剤**: マグネシウム吸収阻害→骨粗鬆症・認知症

→まず始めにやること: 減量・中止

(*ATP: マグネシウムはATPをつくる代謝に必須)

症例)82歳女性 ATD フロンタルバリアント

降圧剤を減量して認知機能改善を認めた1例

X月初診

HDS-R 17/30

数字関係1/4 遅延再生0/6 語義失語なし
レビースコア 0

ピックスコア 8(お風呂拒否・二度童・
オウム返し・甘いもの好き・スイッチ易怒・
一人にされると寂しがる)

処方:アムロジピン5mg ロサルヒドLD

ゾルピデム5mg

心電図:HR 57 ICRBBB

診断:アルツハイマー型認知症

治療:フェルラ酸200mg朝開始 降圧剤減量
アムロジピン5→2.5mg
ロサルヒドLD→ロサルタン50mg

X+1月

数字関係2/4 遅延再生2/6(+2)

収縮期圧110台 アムロジピン中止

X+2月

数字関係2/4 遅延再生5/6(+3)

収縮期圧130mmHg ロサルタン50→25mg

X+3月

数字関係3/4 遅延再生6/6(+1)

収縮期圧120 ロサルタン中止

プレタールOD錠 検討

症例)69歳女性 軽度認知障害(MCI)

スタチン中止、降圧剤を調整して認知機能改善を認めた1例

X年9月初診(69歳)

HDS-R 25/30 数字関係3/4 遅延再生4/6

語義失語なし レビースコア 0

ピックスコア 0

処方:スタチン ニフェジピン40mg

ソラナックス0.4mg不安時

心電図:HR 84 NSR

診断:MCI

治療:ニフェジピン減らす40→20mg

ミカルディス20mg開始 プレタール開始

スタチン→ロトリガ

12月

HDS-R 30/30 数字関係4/4 遅延再生6/6

X+1年2月収縮期圧130台

8月収縮期圧120台 ニフェジピン20mg中止

10月収縮期圧120台

ミカルディス20mg→ニューロタン25mg

X+2年5月収縮期圧140台

X+3年6月朝泣いてばかり

ジェイゾロフト25mg開始 9月泣かなくなった

12月収縮期圧160台

ニューロタン25mg→ミカルディス40mg

X+4年6月収縮期圧120台

ミカルディス40→20mg

マグネシウム入浴推奨

マグネシウム入浴



NICHIGA ニチガ
塩化マグネシウム フレークタイプ
経皮吸收


○効能

- ・動脈硬化・高血圧症・糖尿病
- ・骨粗鬆症(体内の60%が骨組織に)
- ・頭痛・肩こり・腰痛・こむら返り
- ・リラックス 良眠
- ・冷え症
- ・皮膚: 髪サラサラ 肌すべすべ
- ・解毒


* 腎機能低下には慎重に
* 血中Mg濃度

認知症の治療は
西洋薬+漢方薬+サプリメントの3本立て

互いの長所を活かし最適な治療を創造する



脳の薬物反応は bell-shaped(釣鐘状)



薬物は適量を超えると
症状が悪化したり
副作用のリスクが高まる

- くすりは最小限にしたい
- 西洋薬(化合物)の代替として
サプリメント・漢方(自然由来の抽出成分)を使う

保険薬の中で使用率NO.1はプレタール®

すべての病型に有効☆

主作用:

- 1) 脳血流増加→アミロイド β 排出
- 2) CREBのリン酸化促進→シナプス機能改善(≒フェルラ酸)

副作用: 頭痛・頻脈・胸痛・浮腫

(心房細動や虚血性心疾患には使いにくい)

プレタールOD錠 49/100 (2019年10月)

25mg × 1朝 0名

50mg × 1朝 33名

100mg × 1朝 3名


50mg × 2朝夕 11名

100mg × 2朝夕 3名


＜効能・効果＞
・閉塞性動脈硬化症
・脳梗塞発症後の再発抑制

* プレタール®: シロスタゾールの先発品

陰証・陽証に分けて治療計画を立てる



認知症の症状と治療薬



サプリメント

抗酸化・抗炎症

サプリを学ぶと薬のことがもっと分かる

免疫増強作用を有するビタミン・ミネラル



<ATPセット>

- ・ビタミンB50
- ・ビタミンC 3000 mg
- ・ビタミンE 400 IU～
(d- α トコフェロール)
- ・ビタミンD3/K2
2000 IU
- ・亜鉛(ZINC) 20 mg
- ・マグネシウム 400 mg

ビタミンD☆

- ・世界的にビタミンD欠乏症が問題になっている
- ・脂溶性ビタミン
- ・2種類:ビタミンD2・D3
- ・皮膚での合成に由来(D3)
- ・心血管疾患 がん 糖尿病 認知機能 免疫力 フレイル
- ・血清25(OH)D 基準値30-100 ng/mL(米国内分泌学会)
- ・日本で行われた疫学調査
不足・欠乏者の割合 男72.5% 女88%

Profiles of vitamin D insufficiency and deficiency in Japanese men and women: association with biological, environmental, and nutritional factors and coexisting disorders: the ROAD study. Yoshimura N, et al., Osteoporos Int 2775-87, 2013

ビタミンK☆

- ・健康維持に重要な働き
- ・脂溶性ビタミン
- ・2種類:ビタミンK1・K2(MK-1から14まで自然界に存在)
- ・骨代謝の調整に働く
- ・納豆摂取によりMK7濃度↑骨折リスク軽減
- ・動脈石灰化防止・心不全リスク低下
- ・2型糖尿病リスク低下・乳がん発生率低下
- ・相乗効果:ビタミンDとビタミンKセットで摂取
- ・スタチンはビタミンK2阻害剤

L-グルタミン




効能)
食欲が出た
胃腸の調子が良くなつた
風邪を引かなくなつた

飲み方)
プロテインに追加する
EAAに追加する
1日5-10g

処方)マーズレンS配合顆粒 0.5g/包
市販薬)スクラート胃腸薬(ライオン)

赤ミミズ酵素



ルンブルクス・ルベルス
(国内で養殖)

内臓の一部を採取して
凍結乾燥→粉末加工

作用)

- ・抗酸化
- ・免疫増強
- ・血栓溶解

○効能

- ・頸動脈プラーク退縮
- ・血管年齢(15歳若返る)
- ・糖尿病
- ・高血圧
- ・腸内環境
- ・下肢静脈瘤
- ・うつ 妄想
- ・腎機能低下
- ・脳梗塞・がん
- ・耳鳴り
- ・褥瘡 歯周病

フェルラ酸(米ぬかのポリフェノール)

認知症治療に
フェルラ酸は必須！

○効能

- ・認知機能
- ・静穏
- ・歩行
- ・嚥下機能
- ・脳炎
- ・糖尿病
- ・白髪が黒く
- ・座骨神経痛
- ・難聴

フェルガードの配合

フェルラ酸

(米ぬかのポリフェノール)

+




バコパモニエラ

+



ガーデンアンゼリカ



フェルガードB 進行性失語

インド伝統医学でもっとも認知機能が改善すると言われているハーブ

症例)86歳男性 神経原線維変化型老年期認知症(SDNFT)

ドネペジル中止 フェルラ酸・赤ミミズエキス開始して認知機能改善を認めた1例

X年3月初診

HDS-R 15/30 数字関係3/4 遅延再生1/6

語義失語なし

レビースコア 1(真面目な性格)

ピックスコア 0

処方:ドネペジル5mg フルバスタチン30mg
ネキシウム20mg

心電図:HR 57 I 度AVブロック

診断:SDNFT

治療:ドネペジル中止

フェルガード100M開始

5月数字関係4/4 遅延再生1/6

ルベスト(赤ミミズエキス)3個開始

7月食欲低下

補中益氣湯2.5g 開始

HDS-R 21/30 数字関係3/4 遅延再生4/6

8月食欲改善

9月プレタール50mg開始


抗精神病薬で過鎮静 フェルラ酸100mg・ガーデンアンゼリカ20mgが奏効したピックタイプの1例



症状)
施設の玄関に居座り
来訪者に暴言を投げかける
食事はいつも一気食い(ピック症状)

治療)
薬を増量していくと寝てしまう(過鎮静)
全く改善なし
フェルラ酸サプリメントを開始したところ
数日で穏やかに

フェルラ酸は陰陽の波を小さくしてくれる



利点: 抗精神病薬を減量できる

フェルラ酸サプリメント飲用3年後に歩行可能となつたDLB



201X年 8月
歩けない 立ち上がるれない
治療開始)
リバスチグミン4.5mg
レボドパ・カルビドパ50mg→100mg
フェルラ酸サプリ グルタチオン点滴

3か月後
上記で歩行改善せず

3年後
車椅子から立ち上がって
歩けるように
処方)
ガランタミン4mg朝+4mg夕
レボドパ・ベンセラジド2錠分2

Mガード®:ミエリン修復サプリメント



成分:

- ヘスペリジン 温州みかんの皮
- ナリルチン 柑橘類じやはらの皮
- α -GPC (α -グリセロホスホコリン) 大豆由来
- 桂皮エキス(シナモン酸)

作用:再ミエリン化

- 陳皮:未活動の神経幹細胞(OPC)の分裂を促進
- α -GPC:ホスファチジルコリン(ミエリンの原料)を増やす
- 桂皮:アストロサイトの機能を正常化


臨床で有効性を認めた脳神経変性疾患は？

- 1) アルツハイマー型認知症(ATD)
- 2) レビー小体型認知症(DLB)
- 3) 原発性進行性失語(PPA)
意味性認知症(SD-FTD)
進行性非流暢性失語(PNFA-CBD)

その他

花粉症(ナリルチンがヒスタミンを抑制)

Mガード®の効果 (2017年～)



臨床効果：

記憶力・集中力
発語
パーキンソニズム
(姿勢 歩行 振戦 誤嚥)
不安(表情が明るく)
意欲 (料理をするようになった)
尿失禁
てんかん
難聴
花粉症
高齢の犬・猫

休憩


睡眠と栄養

脳は睡眠・栄養が足りないと真っ先に影響を受ける

脳の構成: 神経細胞(20%)・グリア細胞(20%)・血管・髄液

- タンパク質は記憶の主要な構成要素である
- 神経伝達物質の主原料はアミノ酸である
- 栄養障害があると薬もサプリも効きにくい
- グリア細胞は夜間睡眠時に脳のメンテナンスをする
- アストロサイトを中心とした脳内老廃物排出システム(グリンパティック・システム)は夜間睡眠時に活性化する

岩立康男 先生 脳神経外科学 前教授（昭和58年千葉大卒）



グリア細胞の特徴

- ・豊富な突起を有している
- ・その維持に膨大なエネルギーが必要になる
- ・酸化ストレスや炎症によって
真っ先に脱落していく

脳寿命を延ばすには
グリア細胞を護るという発想が重要になる

アミノ酸（コドン表）

1文字目	3文字目	2文字目							
		U		C		A		G	
U	U	UUU	フェニルアラニン	UCU	セリン	UAU	チロシン	UGU	システイン
	C	UUC		UCC		UAC		UGC	
	A	UUA		UCA		UAA		UGA	終止
	G	UUG		UCG		UAG		UGG	トリプトファン
C	U	CUU	ロイシン	CCU	プロリン	CAU	ヒスチジン	CGU	アルギニン
	C	CUC		CCC		CAC		CGC	
	A	CUA		CCA		CAA		CGA	
	G	CUG		CCG		CAG		CGG	
A	U	AUU	イソロイシン	ACU	トレオニン	AAU	アスパラギン	AGU	セリン
	C	AUC		ACC		AAC		AGC	
	A	AUA		ACA		AAA	リジン	AGA	アルギニン
	G	AUG		ACG		AAG		AGG	
G	U	GUU	バリン	GCU	アラニン	GAU	アスパラギン酸	GGU	グリシン
	C	GUC		GCC		GAC		GGC	
	A	GUA		GCA		GAA	グルタミン酸	GGA	
	G	GUG		GCG		GAG		GGG	

塩基(U C A G)

連続した3個の塩基配列が
一つのアミノ酸を規定する

アミノ酸: 61種類



- ・質のよいタンパク質
- ・植物性と動物性
満遍なく摂取したい

毎日卵2-3個 納豆1パック 食べよう！

卵1個(50g)

エネルギー量76 kcal

タンパク質6.2g

脂質5.2g

炭水化物0.2g

プロテインスコア100

＜卵白＞

ビタミンB2 カルシウム

アビジン× オボムコイド×

(生ではなく加熱して)

＜卵黄＞

脂溶性

ビタミンA E D K(MK-7)

水溶性ビタミンB1 鉄

レシチンが豊富

(細胞膜の主要な成分)

高タンパク入門

ザバスミルクプロテイン P109



甘味料:アセスルファムK スクラロース



ホエイプロテイン WPI NICHIGA



- ・グラスフェッド牛の乳清を使用
(広大な自然の中で放牧)
- ・成長ホルモン 不使用
- ・Non-GMO牧草
- ・人工香料・甘味料 不使用
- ・WPI(Whey Protein Isolate)
- ・タンパク質88.9g/製品100g

2023年12月7日 Amazon 3720円/kg 9093円/3kg

EAA: Essential Amino Acids

必須アミノ酸（体内で作れないアミノ酸）

飲み方）

プロテインと併用する 10% 例：プロテイン20gに対しEAA2g

少しずつ増やしていく 1回2-4g 1日1-2回
処方) ESポリタミン2g/包 1日8gまで保険適用

* 興奮・下痢・頭痛・湿疹が出た場合は減らす



EAA: Essential Amino Acids



パウダータイプ

Impact EAA | 1kg / 500g / 250g

**コスパの高さと
早い吸収力**

粉末パウダーは錠剤にくらべて吸収が早いのが特徴。フレーバーも12種類ご用意しているので、自分好みの味を見つけて筋トレを楽しみながら続けられます。

味にもこだわった12種類のフレーバー

グレープ	プラム
コーラ	メロン
ストロベリー&ライム	柚子
トロピカル	ラズベリーレモネード
ピンクマンゴー	ラムネ
ピンクグレープフルーツ	ノンフレーバー

EAAの効果

- ・骨が丈夫になる
- ・血管が丈夫になる
- ・褥瘡が治りやすくなる

<美容効果>

- ・髪に艶が出てきた
- ・爪が綺麗になった
- ・肌が白くなつた

<メンタル>

- ・よく眠れるようになった
- ・イライラしなくなった
- ・落ち込まなくなった

症例)82歳女性 意味性認知症(SD)

ESポリタミン開始して栄養状態改善を認めた1例

X年7月初診(82歳)

HDS-R 2/30 数字関係0/4 遅延再生0/6

語義失語あり(利き手×右手で左肩を×)

レビースコア 0 ピックスコア 8

Alb 3.5 Hb 10.8 MCV 90 フェリチン60

処方:前医メマンチン(メマリー®)20mg

診断:SD

治療:メマンチン20→10mg

プレタール50mg開始

9月食欲低下 補中益氣湯 開始

10月完食している

貧血 人参養栄湯 開始

X+1年8月 Alb 3.5 ↓ BUN 13.7

ESポリタミン4g開始

Mガード開始

9月指示が入りやすくなった

補中益氣湯 中止

10月ESポリタミン増やす8g/日

12月便秘 麻子仁丸 開始

X+2年1月Mガードで言葉が出るように

8月 Alb 4.1 Hb11.2

X+3年1月

冷え 当帰四逆加吳茱萸生姜湯 開始

4月 Hb 12.0 BUN 18.8

腦腸相關

脳の健康は腸にあり

○粘膜免疫：腸は免疫の司令塔
小腸には免疫細胞の約70%が集まっている（タンパク質が材料）

○腸内細菌の働き
食物繊維を腸内で発酵→さまざまな代謝産物を作り出している（セロトニン・GABA）
大腸のエネルギー源となる短鎖脂肪酸をつくっている

1) ビフィズス菌→乳酸・酢酸

2) 乳酸菌→乳酸

3) 酪酸菌（長寿菌）→酢酸・酪酸（短鎖脂肪酸）

ミネラルの吸収を助ける

自閉症スペクトラム・うつ・不安・ぜんそく・アトピーなど

腸内フローラとは

腸内細菌は約30000種類

人間には200から1000種類（この種類は生涯変化なし）

理想的比率：善玉菌2・悪玉菌1・日和見菌7

善玉菌＝ビフィズス菌 乳酸菌など

悪玉菌＝ブドウ球菌 ウエルシュ菌 大腸菌有毒株など

日和見菌＝バクテロイデス 大腸菌無毒株 連鎖球菌など

運動・抗酸化物質・ポリフェノールは腸内フローラ改善効果あり

（京都府立医科大学付属病院 内藤裕二）

腸内フローラ改善のための食事



- 発酵食品(値段の高いもの推奨)
納豆・味噌・熟成醤油・ぬか漬け
- 食物繊維
 - ・水溶性
ペクチン(大根 キャベツ イモ類)
アルギン酸(海藻類のヌルヌルした成分)
イヌリン(キクイモ ゴボウ たまねぎ ニンニク)
 - ・不溶性
セルロース(玄米 小麦ふすま 穀類 大豆)
推奨) 冷やし焼いも
食物繊維が豊富(水溶性1.0g 不溶性2.8g)
毎日100g摂って腸内環境を整えよう

MCT(中鎖脂肪酸)



MCT: Medium-Chain Triglyceride

ココナッツオイルなどに多く含まれる

○ MCTオイル

中鎖脂肪酸100%オイル 無味無臭

消化吸収に優れる

腸を弱酸性に保つ

悪玉菌の活動を抑える

アルツハイマー病に対する効果も期待できる

ポリフェノール

植物が光合成を行う際に作り出す抗酸化物質

カフェインレスコーヒー



成分)

クロロゲン酸(コーヒーポリフェノール)
コーヒーの特徴といえる褐色・苦味

効能)

- ・抗酸化作用
老化防止 シミ シワなど
 - ・ダイエット効果
脂肪燃焼を促進する
 - ・糖尿病の予防効果
糖質の吸収を緩やかに
- デメリット)
- 胃酸分泌を活性化 ミネラル吸収阻害
- 飲み方)
- 食後に 1日に4杯まで

1日1回プロテインドリンク推奨



シェーカーに氷と水200-300cc
WPIホエイプロテイン60-90cc
カフェインレスコーヒー適量
MCTオイル小さじ1から大さじ1
はちみつ

認知症のタイプ別治療法と 症状が改善した実例

アルツハイマー型認知症(ATD)

J-STAGE(オンライン)

アルツハイマー型認知症における軸索変性に対する
Mガード®・メマンチン併用効果の検討

認知症治療研究会会誌
2022年8巻1号p51-54

松野晋太郎 Mガードで検索

レビータイプ (DLB:レビー小体型認知症)

自律神経症状 幻視 意識レベルの変動
パーキンソニズム うつ レム睡眠行動障害



レビー小体型認知症は生真面目

生真面目な人ほどドパミンが欠乏しやすい？


子供たちも真面目 詳細な資料を持参する




宝島社主催 第21回このミステリーがすごい！大賞受賞作 『名探偵のままでいて』 小西マサテル



アセチルコリン(A) - ドバミン(D)天秤



アセチルコリン(A) - ドバミン(D)天秤



74歳男性 レビー小体型認知症 HDS-R 21



＜動画＞

7か月
HDS-R 21→25



経過	初診時 HDS-R 21 ドネペジル5mg	2か月後 リバスチグミン4.5mg(かぶれ) ドパコール漸増して50mg×3 ペルゴリド50μg×1	5か月後 レミニール4mg(鍵穴) ドパコール50mg×2朝夕 マドパー2錠昼夕 アマンタジン50mg×2朝昼	3年後 抗認知症薬なし メネシット50mg朝 マドパー2錠朝夕 アマンタジン50mg朝 ニセルゴリン5mg朝
----	-----------------------------	---	---	---

ピック症状を治したらレビ一らしさが見えてきたLPCの1例


85歳 男性 HDS-R 実施できず(2013年5月施設往診開始)



診察拒否
暴言 暴力 徘徊 放尿
→ウインタミン4+6mg開始

聴診させてくれた
帽子を脱いで「ありがとう！」
6+6mgで放尿しなくなった！

グルタチオン点滴(600mg~)



コウノメソッド導入 2014年1月から

○臨床

- ・歩行機能
- ・アパシー(無表情→笑顔・瞳の輝き)
- ・薬物の解毒
(ドネペジル過量・向精神薬による過鎮静)
- ・腰痛 線維筋痛症
- ・慢性疲労
- ・湿疹

症例)81歳女性 LPC 長谷川式認知症スケール4/30



＜前医の診断・治療＞
アルツハイマー型認知症
ガランタミン12mg朝+12mg夕

2015年6月当院初診
＜問診・診察＞
不機嫌 暴力(皿を投げてくる)
じっとしていられない
日中傾眠 幻視 妄想
頸部後屈 齒車様筋固縮

2015年6月

2015年8月

2015年10月

2015年11月

前医の診断: アルツハイマー型認知症 (レビースコア11 ピックスコア6)



レミニール24mg

ウイントミン4+6mg
リバスタッチ4.5mg
抑肝散5g
グルタチオン点滴

リバスタッチ4.5mg
ドパコール100mg × 2
ニュープロパッチ2.25mg
ウイントミン6mg頓用
グルタチオン点滴

リバスタッチ9→4.5mg
ドパコール100mg × 2
ニュープロパッチ4.5mg
グルタチオン点滴
麻子仁丸5g

81歳女性 Lewy - Pick complex 改訂長谷川式スケール 4



本日のまとめ

- 多様な症状に対して東洋医学で対応
(症状の陰陽を意識して治療法を組み立てよう!)
- 栄養療法を導入して改善率を高める
(くすりをできるだけ減らそう!)
- 薬もサプリメントも少量から開始して適量を探る
(用量・用法を工夫して最高の改善率を目指そう!)

第80回
ドクターマツノ認知症ゼミ

2024年02月04日(日)

Thank you for your attention.